مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران
سال۲۲، شماره‌ی ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، صص ۱۷۲ – ۱۵۹

پیش‌بینی سری‌های زمانی تجمعی کوتاه‌مدت به‌روش رگرسیونی بر اساس مجموع‌های جزیی

سودابه فیض‌بخش کوفلی*، سیده سحر رادمهر و محمدرضا صالحی راد

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده: در این مقاله، مسئله‌ی پیش‌بینی یک سری زمانی با تعداد اندکی از داده‌ها، در یک روش رگرسیونی خلاصه شده است. این روش زمانی به خوبی کار می‌کند که روش‌های استاندارد برای تعداد مشاهدات اندک قابل استفاده نباشند. کمیت پیش‌بینی‌شده مقدار تجمعی از یک متغیر پیوسته و مثبت است به گونه‌ای که داده‌های گرداوری‌شده به‌صورت جزیی موجود هستند. یک مدل خیلی ساده برای توصیف رابطه‌ی بین مقادیر کلی و جزیی متغیری که قرار است پیش‌بینی شود، تحت فرض الگوی فصلی پایدار، پیشنهاد شده است. این شرایط به‌طور طبیعی در پیش‌بینی فروش‌های فصلی انواع کالاها مثلاً اسباب‌بازی‌ها، یا سپرده‌های بانکی ظاهر می‌شود.

واژگان کلیدی: تجمعی جزیی؛ روش رگرسیونی؛ پیش‌بینی؛ سری‌های زمانی؛ الگوی فصلی پایدار.

۱- مقدمه

در این مقاله مسئله‌ی پیش‌بینی یک سری زمانی با تنها تعداد اندکی از داده‌ها با استفاده از روش رگرسیونی مورد بررسی قرارمی‌گیرد. کمیت پیش‌بینی‌شده، مقدار تجمعی یک متغیر پیوسته و مثبت است. این شرایط در بسیاری از مسایل کاربردی ظاهر می‌شوند. مثال‌هایی از این نوع متغیرها را می‌توان در مقاله‌های [۳] و [۱۱] و [۱۰] مشاهده کرد. به‌ویژه، مثال‌هایی که دارای الگوی فصلی نیز می‌باشند، در مقاله‌های [۹] و [۲] بررسی شده است. در مقاله‌ی [۴] برای سری‌های تجمعی گسسته که دارای الگوی فصلی پایدار

* نویسنده‌ی عهده‌دار مکاتبات
دریافت: ۱۳۹۱/۱/۱۴، پذیرش: ۱۳۹۱/۸/۲۳

[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]

بوده‌اند و تعداد مشاهدات آن‌ها اندک بوده، پیش‌بینی‌هایی به‌دست آمده است. در مقاله‌ی [۵] یک روش پیش‌بینی بیزی برای سری‌های پیوسته تجمعی که دارای الگوی فصلی پایدار بوده و تعداد مشاهدات در آن‌ها اندک می‌باشد، پیشنهاد شده است. در مقاله‌ی [۶] برای همین نوع از سری‌ها، یک روش جدیدتر که دارای انطاف‌پذیری بیش‌تر و نتایج دقیق‌تری نسبت به روش مربوط به مقاله‌ی [۵] بود، پیشنهاد شد. در مقاله‌ی [۸] از یک روش نسبتی برای پیش‌بینی سری‌های تجمعی پیوسته که دارای الگوی فصلی پایدار و تعداد مشاهدات اندک می‌باشند، استفاده شد.

در همه‌ی این مقاله‌ها، یکی از شرایط لازم برای پیش‌بینی کل یک سال، معلوم بودن حداقل یکی از مقادیر جزیی (ماهانه) آن سال می‌باشد. اما اگر اطلاعات جزیی آن سال موجود نباشد، چه باید کرد؟ در این مقاله با استفاده از روش رگرسیونی، می‌توان این مقادیر جزیی تجمعی و مقدار تجمعی کل سال را پیش‌بینی نمود.

۲- پایداربودن فصلی

فرض می‌کنیم برای زمان مشخص $t > t_0$، Z_t نشان‌دهنده‌ی مقدار تجمعی متغیر Z در بازه‌ی $\left[t_0, t\right)$ باشد که در آن t_0 یک مقدار دلخواه است.

سری $\{X_i\}$ را به‌صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$X_i = Z_{\left(t_0+\Delta i\right)} - Z_{\left(t_0+\Delta\left(i-1\right)\right)} \quad i = 1, \dots, n \quad \Delta > 0$$

که در آن Δ طول فاصله‌های مشاهده‌ای است.

مسئله‌ی مورد نظر در این جا پیش‌بینی X_{n+1} براساس اطلاعات گذشته‌ی $X_1, X_2, \dots, X_n$ می‌باشد. اگرچه با معلوم بودن ماهیت فرایند تجمعی، گاهی اوقات ممکن است که اطلاعات اضافی به شکل یک سری تجمعی جزیی Y_i^{α} به‌دست آید. این اطلاعات برای ما مفید و ارزشمند هستند و از آن‌ها برای پیش‌بینی استفاده می‌کنیم. ساختار یک سری با این نوع به‌صورت زیر است:

$$Y_i^{\alpha} = Z_{\left(t_0+\alpha\Delta i\right)} - Z_{\left(t_0+\Delta\left(i-1\right)\right)} \quad i = 1, \dots, n \quad \Delta > 0$$

[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]

که در آن $\alpha \in (۰,۱)$ مقداری ثابت و معلوم و $Z_{t_۰} = ۰$ است. بنا بر این برای هر یک از فاصله‌های مشاهده‌شده به‌طول Δ، مقدار تجمعی بخش ابتدایی به طول $\alpha\Delta$ به‌دست می‌آید.

برای مثال، در برخی کاربردها، X_i مقدار تجمعی Z در سال iام است و Y_i^{α} مقدار تجمعی متغیر Z در اولین ماه $\left(\alpha = \frac{۱}{۱۲}\right)$ یا اولین فصل $\left(\alpha = \frac{۱}{۴}\right)$ و یا نیمه‌ی اول سال $\left(\alpha = \frac{۱}{۲}\right)$ است. در بیش‌تر روش‌های پیش‌بینی، تنها از سری $X_۱, X_۲, \dots, X_n$ برای پیش‌بینی $X_{n+۱}$ استفاده می‌شود. علی‌رغم این حقیقت که سری $Y_۱^{\alpha}, Y_۲^{\alpha}, \dots, Y_n^{\alpha}$ ممکن است شامل اطلاعات ارزشمندی باشد. واضح است هر چه قدر α به یک نزدیک‌تر باشد، Y_i^{α} به X_i نزدیک‌تر خواهد بود و در حالتی که $\alpha = ۱$ آنگاه $Y_i^{\alpha} = X_i$.

در مقاله‌های [۳]، [۷]، [۹]، [۱۰] و [۱۱] از سری‌های تجمعی جزیی استفاده کرده‌اند. در مقاله‌های [۴]، [۵] و [۶] سری‌های تجمعی جزیی که دارای الگوی فصلی پایدار بوده و تعداد مشاهدات در آن‌ها اندک است به‌کار رفته است.

در این‌جا به یک ملاک عملی برای بررسی پایداری الگوی فصلی احتیاج داریم. با توجه به این‌که سری‌های مورد نظر در این‌جا از نوع کوتاه‌مدت (سه سال) هستند، برای بررسی فصلی بودن، نمی‌توانیم از روش‌های معمول سری‌های زمانی مانند تابع خود همبستگی یا تابع خود همبستگی جزیی و یا دورنگار طیف استفاده کنیم. لذا برای انجام این کار می‌توانیم نسبت‌های تجمعی

$$P_۱^{\alpha} = \frac{Y_۱^{\alpha}}{X_۱},\ P_۲^{\alpha} = \frac{Y_۲^{\alpha}}{X_۲},\ P_۳^{\alpha} = \frac{Y_۳^{\alpha}}{X_۳},\ \left(r = ۱, \dots, ۱۲\ , \alpha = \frac{r}{۱۲}\right),$$

را برای این سه سال $(n = ۳)$ به‌دست آوریم. اگر نمودارهای سه سال بر هم منطبق باشند، نشان‌دهنده‌ی الگوی فصلی پایدار است.

۳- روش رگرسیونی

اگر به واحدهای جامعه‌ای، شماره‌های $N, \dots, ۱$ را نسبت دهیم، و Y_i اندازه‌ی واحد شماره‌ی i باشد و بین Y_i و شماره‌ی آن رابطه‌ی

[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]

برقرار باشد می‌گوییم جامعه دارای روند خطی است. معمولاً برای تحقیق درباره‌ی این که جامعه‌ای دارای این روند است یا نه، می‌توان از روش کلاسیک تعیین خم رگرسیونی زوج (i, Y_i) استفاده کرد. اگر نمودار خم رگرسیونی راست باشد، جامعه دارای روند خطی است.

در مورد سری زمانی تجمعی مورد نظر در این مقاله، $X_i (i = ۱, ۲, ۲)$ نشان‌دهنده‌ی مقدار تجمعی سالانه و $Y_{ij} (j = ۱, \dots, ۱۲ , i = ۱, ۲, ۳)$ نشان دهنده‌ی مقدار تجمعی ماهانه است. برای مثال $X_۱$ مقدار تجمعی مربوط به سال اول و $Y_{۱۱}$ مقدار تجمعی ماه اول از سال اول و یا $Y_{۱۲}$ مقدار تجمعی دو ماه اول از سال اول و $Y_{۱۳}$مقدار تجمعی سه ماه اول از سال اول است و ... که در جدول ۱ مشاهده می‌شود.

جدول ۱- مقادیر تجمعی ماهانه و سالانه

۳	۲	۱ I	
			j
$Y_{۳۱}$	$Y_{۲۱}$	$Y_{۱۱}$	۱
$Y_{۳۲}$	$Y_{۲۲}$	$Y_{۱۲}$	۲
$Y_{۳۳}$	$Y_{۲۳}$	$Y_{۱۳}$	۳
$Y_{۳۴}$	$Y_{۲۴}$	$Y_{۱۴}$	۴
$Y_{۳۵}$	$Y_{۲۵}$	$Y_{۱۵}$	۵
$Y_{۳۶}$	$Y_{۲۶}$	$Y_{۱۶}$	۶
$Y_{۳۷}$	$Y_{۲۷}$	$Y_{۱۷}$	۷
$Y_{۳۸}$	$Y_{۲۸}$	$Y_{۱۸}$	۸
$Y_{۳۹}$	$Y_{۲۹}$	$Y_{۱۹}$	۹
$Y_{۳\ ۱۰}$	$Y_{۲\ ۱۰}$	$Y_{۱\ ۱۰}$	۱۰
$Y_{۳\ ۱۱}$	$Y_{۲\ ۱۱}$	$Y_{۱\ ۱۱}$	۱۱
$Y_{۳\ ۱۲}$	$Y_{۲\ ۱۲}$	$Y_{۱\ ۱۲}$	۱۲
$X_۳$	$X_۲$	$X_۱$	کل

[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]

در مسئله‌ی مورد بحث در این مقاله با توجه به پایداری الگوی فصلی، بین Y_{ij} (مقدار تجمعی مربوط به ماه jام) و شماره‌ی آن(سال iام)، رابطه‌ی خطی به‌صورت زیر برقرار است:

$$y_{ij} = a + bi \quad (y_{ij}, i)\ i = ۱, ۲, ۳$$

از این رابطه‌ی خطی می‌توانیم برای پیش‌بینی مقدار آینده‌ی سری زمانی استفاده کنیم. فرض می‌کنیم مقادیر تجمعی ماهانه و سالانه‌ی مربوط به سال سوم $(i = ۳)$ مجهول است. هدف ما پیش‌بینی این مقادیر تجمعی است.

برای مثال،فرض کنید می‌خواهیم مقدار تجمعی مربوط به ماه اول، یعنی $y_{۳۱}$ را پیش‌بینی کنیم. برای انجام این کار، ابتدا رابطه‌ی خطی بالا را برای دو سال اول به‌صورت زیر می‌نویسیم:

$$\begin{cases} y_{۱۱} = a + b \times ۱ \\ y_{۲۱} = a + b \times ۲ \end{cases}$$

سپس، براورد مقادیر (a, b) را به دست آورده و با جایگذاری این مقادیر در رابطه‌ی

$$y_{۳۱} = a + b \times ۳$$

مقدار مربوط به $y_{۳۱}$ را به دست می‌آوریم. به‌همین ترتیب می‌توانیم بقیه‌ی مقادیر تجمعی، یعنی $Y_{۲۳}$ و$Y_{۳۳}$و... و $Y_{۱۲}$ ۳ و $X_{۳}$ را پیش‌بینی کنیم.

۴- کاربردها

۴-۱- پیش‌بینی میزان مصرف برق ایالت آیووا و استان گیلان

مثال اول، مربوط به میزان مصرف برق ایالت آیووا (Iowa) برای سال‌های ۱۹۷۶ الی ۱۹۷۸ است. این سری، در مقاله‌ی [۵]، مورد بررسی قرار گرفته است. البته در آن مقاله پیش‌بینی به‌کمک روش بیزی و ARIMA انجام گرفته است. اما در مقاله‌ی حاضر، ما از روش رگرسیونی استفاده کرده و پیش‌بینی‌ها را انجام داده‌ایم. مقادیر تجمعی جزیی و کلی این سری در جدول ۲ مشاهده می‌شود.

مثال دوم، مربوط به میزان مصرف برق در استان گیلان است. این سری در پایان‌نامه‌ی [۱] موجود می‌باشد. در آن‌جا پیش‌بینی‌های مورد نظر با استفاده از روش

[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]

بیزی انجام گرفته است. ما در این بخش می‌خواهیم این پیش‌بینی‌ها را با استفاده از روش رگرسیونی انجام دهیم.

جدول ۳ مقادیر تجمعی جزیی مربوط به مصرف برق استان گیلان را در سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲ نشان می‌دهد.

جدول ۲- مصرف برق آیووا (Kw/h)

ماه	مشاهدات مقادیر جزیی		
	۱۹۷۶	۱۹۷۷	۱۹۷۸
Jan	۵۲۳	۵۳۰	۵۳۵
Feb	۵۰۲	۵۰۷	۵۰۳
Mar	۴۳۹	۴۳۶	۴۶۴
Apr	۴۲۰	۴۰۷	۴۱۴
May	۳۸۷	۳۹۲	۳۸۳
Jun	۴۵۳	۵۳۱	۴۷۲
Jul	۶۳۰	۷۱۰	۶۷۶
Aug	۶۳۷	۶۵۸	۶۲۲
Sep	۵۷۶	۵۰۰	۶۵۲
Oct	۴۱۱	۴۱۴	۴۷۴
Nov	۴۵۵	۴۱۸	۴۲۲
Des	۵۱۲	۵۲۰	۵۰۱
کل	۵۹۴۵	۶۰۲۳	۶۱۱۸


۱-۱-۴- بررسی پایداری الگوی فصلی

قبل از انجام پیش‌بینی لازم است که این دو سری مشاهدات، از نظر فصلی بودن مورد بررسی قرار گیرند. نمودار ۱ مربوط به مصرف برق ایالت آیووا است و با توجه به این که نسبت‌های تجمعی برای سال‌های متوالی منطبق بر یکدیگر هستند، نشان می‌دهد که سری مورد نظر از یک الگوی فصلی پایدار پیروی می‌کند. نمودار ۲ مربوط به مصرف برق استان گیلان است که در این نمودار نیز پایداری الگوی فصلی وجود دارد.

[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]


جدول ۳- مصرف برق گیلان (Mw/h)

ماه	مشاهدات مقادیر جزیی		
	۱۳۸۰	۱۳۸۱	۱۳۸۲
فروردین	۲۱۵/۱	۲۲۱/۲	۲۴۲/۲
اردیبهشت	۲۳۲/۵	۲۳۴/۲	۲۵۰/۷
خرداد	۲۳۳/۴	۲۳۱/۸	۲۶۱/۶
تیر	۲۵۸/۶	۲۸۷/۶	۲۹۹/۹
مرداد	۲۸۲/۵	۳۰۳/۳	۳۰۴/۶
شهریور	۲۵۳/۵	۲۶۵/۷	۳۰۳/۸
مهر	۲۳۷/۲	۲۵۷/۳	۲۶۶/۲
آبان	۲۳۵/۱	۲۴۷/۷	۲۶۵/۲
آذر	۲۳۸/۲	۲۵۳/۶	۲۶۷/۴
دی	۲۳۶/۶	۲۵۱/۲	۲۶۸/۱
بهمن	۲۳۳/۱	۲۵۱/۸	۲۵۹
اسفند	۲۲۰/۴	۲۴۲/۹	۲۵۱/۸
کل	۲۸۷۶/۲	۳۰۴۸/۳	۳۲۴۰/۵



نمودار ۱- نسبت‌های تجمعی مصرف برق گیلان برای سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸

[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]



نمودار ۲- نسبت‌های تجمعی مصرف برق گیلان برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲

۲-۱-۴- پیش‌بینی

درمثال ایالت آیووا، فرض می‌کنیم اطلاعات مربوط به سال ۱۹۷۸ موجود نیست و ما می‌خواهیم با استفاده از روش رگرسیونی این مقادیر تجمعی جزیی (تجمعی ماهانه) و کلی (سال) را برای سال ۱۹۷۸ پیش‌بینی کنیم. برای انجام این کار، ابتدا مقادیر ماهانه را به‌صورت تجمعی (جدول ۳) در نظر گرفته و با استفاده از مقادیر تجمعی سال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ رابطه‌ی زیر را می‌نویسیم:

$$\begin{cases} y_{11} = a + b \times ۱ \\ y_{21} = a + b \times ۲ \end{cases} \rightarrow \begin{cases} ۵۲۳ = a + b \times ۱ \\ ۵۳۰ = a + b \times ۲ \end{cases}$$

پس از آن با جایگذاری مقادیر a , b در رابطه‌ی زیر، می‌توانیم مقدار تجمعی ژانویه‌ی ۱۹۷۸ $\left(y_{31}\right)$را پیش‌بینی کنیم.

$$y_{31} = a + b \times ۱ \quad \rightarrow \quad y_{31} = ۵۳۷$$

به همین ترتیب می‌توانیم بقیه‌ی مقادیر تجمعی سال ۱۹۷۸ را پیش‌بینی کنیم که نتایج آن در ستون آخر جدول ۴ موجود است.

همچنین در مثال مربوط به استان گیلان، فرض می‌کنیم مقادیر تجمعی مربوط به سال ۱۳۸۲ موجود نیست و می‌خواهیم این مقادیر را پیش‌بینی کنیم. برای مثال پیش‌بینی

[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]

مربوط به ماه خرداد را به دست می‌آوریم. ابتدا با استفاده از دو مقدار تجمعی مربوط به سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ داریم:

$$\begin{cases} y_{۱۳} = a + b \times ۱ \\ y_{۲۳} = a + b \times ۲ \end{cases} \rightarrow \begin{cases} ۶۸۱ = a + b \times ۱ \\ ۶۸۷/۲ = a + b \times ۲ \end{cases}$$

سپس با جایگذاری مقادیر a , b در رابطه‌ی زیر، مقدار تجمعی ماه خرداد پیش‌بینی می‌شود.

$$y_{۳۳} = a + b \times ۱ \quad \rightarrow \quad y_{۳۳} = ۶۹۳/۴$$

به همین ترتیب بقیه‌ی مقادیر سال ۱۳۸۲ پیش‌بینی می‌شود که نتایج آن در جدول ۵ مشاهده می‌شود.

جدول ۴- مقادیر تجمعی مصرف برق ایالت آیووا (Kw/h) و براورد مقادیر تجمعی سال ۱۹۷۸

ماه	مشاهدات تجمعی			براورد تجمعی
	۱۹۷۶	۱۹۷۷	۱۹۷۸	۱۹۷۸
Jan	۵۲۳	۵۳۰	۵۳۵	۵۳۷
Feb	۱۰۲۵	۱۰۳۷	۱۰۳۸	۱۰۴۹
Mar	۱۴۶۴	۱۴۷۳	۱۵۰۲	۱۴۸۲
Apr	۱۸۸۴	۱۸۸۰	۱۹۱۶	۱۸۷۶
May	۲۲۷۱	۲۲۷۲	۲۲۹۹	۲۲۷۳
Jun	۲۷۲۴	۲۸۰۳	۲۷۷۱	۲۸۸۲
Jul	۳۳۵۴	۳۵۱۳	۳۴۴۷	۳۶۷۲
Aug	۳۹۹۱	۴۱۷۱	۴۰۶۹	۴۳۵۱
Sep	۴۵۶۷	۴۶۷۱	۴۷۲۱	۴۷۷۵
Oct	۴۹۷۸	۵۰۸۵	۵۱۹۵	۵۱۹۲
Nov	۵۴۳۳	۵۵۰۳	۵۶۱۷	۵۵۷۳
Des	۵۹۴۵	۶۰۲۳	۶۱۱۸	۶۱۰۱
کل	۵۹۴۵	۶۰۲۳	۶۱۱۸	۶۱۰۱

[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]

جدول ۵- مقادیر تجمعی مصرف برق استان گیلان (Mw/h) و براورد مقادیر تجمعی سال ۱۳۸۲


ماه	مشاهدات تجمعی			براورد تجمعی
	۱۳۸۰	۱۳۸۱	۱۳۸۲	۱۳۸۲
فروردین	۲۱۵٫۱	۲۲۱٫۲	۲۴۲٫۲	۲۲۷٫۳
اردیبهشت	۴۴۷٫۶	۴۵۵٫۴	۴۹۲٫۹	۴۳۶٫۲
خرداد	۰٫۶۸۱	۶۸۷٫۲	۷۵۴٫۵	۶۹۳٫۴
تیر	۹۳۹٫۶	۹۷۴٫۸	۱۰۵۴٫۴	۱۰۰۹٫۸
مرداد	۱۲۲۲٫۱	۱۲۷۸٫۱	۱۳۵۹	۱۳۳۳٫۹
شهریور	۱۴۷۵٫۶	۱۵۴۳٫۸	۱۶۶۲٫۸	۱۶۱۱٫۸
مهر	۱۷۱۲٫۸	۱۸۰۱٫۱	۱۹۲۹	۱۸۸۹٫۲
آبان	۱۹۴۷٫۹	۲۰۴۸٫۸	۲۱۹۴٫۲	۲۱۴۹٫۵
آذر	۲۱۸۶٫۱	۲۳۰۲٫۴	۲۴۶۱٫۶	۲۴۱۸٫۵
دی	۲۴۲۲٫۷	۲۵۵۳٫۶	۲۷۲۹٫۷	۲۶۸۴٫۳
بهمن	۲۶۵۵٫۸	۲۸۰۵٫۴	۲۹۸۸٫۷	۲۹۵۴٫۸
اسفند	۲۸۷۶٫۲	۳۰۴۸٫۳	۳۲۴۰٫۷	۳۲۲۰٫۲
کل	۲۸۷۶٫۲	۳۰۴۸٫۳	۳۲۴۰٫۵	۳۲۲۰٫۲

۳-۱-۴- مقایسه‌ی نتایج


با توجه به این که در این دو مثال، مقادیر واقعی پیش‌بینی‌های انجام گرفته موجود است، لذا برای بررسی میزان دقت پیش‌بینی‌ها، نمودار مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی‌شده را رسم می‌کنیم. نمودار ۳ مقادیر پیش‌بینی‌شده و مقادیر واقعی سال ۱۹۷۸ (ایالت آیووا) را نشان می‌دهد. در نمودار ۴ نیز مقادیر پیش‌بینی‌شده و واقعی مربوط به سال ۱۳۸۲ (استان گیلان) نشان داده شده است.

این روش پیش‌بینی دارای چند مزیت است. اول، مقادیر پیش‌بینی‌شده به‌آسانی و به‌سرعت به دست می‌آیند. دوم، این روش علاوه بر این که مقدار کل سال را براورد می‌کند، مقدارهای تجمعی را نیز پیش‌بینی می‌کند. سوم، این پیش‌بینی‌ها نسبت به مقدارهای واقعی دارای نتیجه‌های منطقی هستند. زیرا از روی نمودارهای ۳ و ۴ مشاهده می‌کنیم که مقادیر پیش‌بینی‌شده و براوردشده نزدیک به یکدیگرند.

[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]



نمودار۳- مقایسه‌ی مقادیر تجمعی براوردشده و پیش‌بینی‌شده‌ی ایالت آیووا



نمودار ۴- مقایسه‌ی مقادیر براوردشده و واقعی مصرف برق استان گیلان

[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]

۵- نتیجه‌گیری

در این‌جا برای مسائل مربوط به پیش‌بینی متغیر تجمعی بخشی از یک دوره (سال)و کل یک دوره، بر اساس مقادیر تجمعی جزیی (مقدار کل سال را تجمعی کل و مقادیر تجمعی ماهانه را تجمعی جزیی در نظر می‌گیریم) ارایه گردید. اساسی‌ترین فرض در این روش وجود الگوی فصلی پایدار و در عین حال کم بودن تعداد مشاهدات در دسترس، می‌باشد. این روش فقط برای متغیرهای پیوسته و مثبت مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه کارایی این روش برای سایر حالات نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. در این روش، مقادیر پیش‌بینی‌شده به‌آسانی و به‌سرعت به دست می‌آیند. این روش علاوه بر پیش‌بینی مقدار تجمعی کل سال، مقادیر تجمعی جزیی همان سال را نیز پیش‌بینی می‌کند.

توضیحات

برنامه‌ی مربوط به پیش‌بینی مصرف برق ایالت آیووا با روش رگرسیون خطی در نرم‌افزار R:

```
y=matrix(c(523,1025,1464,1884,2271,2724,3354,3991,4567,4978,5433,594
5,530,1037,1473,1880,2272,2803,3513,4171,4671,5085,5503,6023),nrow=2
,ncol=12,byrow=T)
a=matrix(c(1,1,1,2),nrow=2,ncol=2,byrow=T)
b=t(a)
q=b%*%a
w=solve(q)
t=w%*%b
v=t%*%y
y3=matrix(c(1,3),nrow=1,ncol=2,byrow=T)
x3=y3%*%v
x3
```


[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]

مرجع‌ها

[۱] طیفوری، وحید (۱۳۸۴). پیش‌بینی سری‌های زمانی تجمعی به روش بیز، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه آمار.

[2] Abraham, B. and Ledolter, J. (1983). *Statistical Methods for Forecasting*: Wiley, New York.

[3] Chen, R., and Fomby, B.T. (1999). Forecasting with stable seasonal pattern models with application to Hawaiian tourism data, *Journal of Business and Economic Statistics*, **17**, 497–504.

[4] De Alba, E. and Mendoza, M. (1996). A discrete model for Bayesian forecasting with stable seasonal patterns, In T. B. Fomby, & RC. Hill (Eds.), Advances in econometrics. Bayesian Methods Applied to Time Series Data, vol. 11 (pp. 267– 281). Stamford, CT7 JAI Press.

[5] de Alba, E., and Mendoza, M. (2001). Forecasting an accumulated series based on partial accumulation: A Bayesian method forshort series with seasonal patterns, *Journal of Business andEconomic Statistics*, **19**, 95– 106.

[6] de Alba, E., and Mendoza, M. (2006). Forecasting an accumulated series based on partial accumulation II: A Bayesian method forshort series with seasonal patterns, *International Journal of Forecasting*, **22**, 781–798.

[7] de Alba, E. (1988). PronosticoBayesiano de agregados en procesos estacionales estables, *Revista Estadıstica*, **2**, 1–6.

[8] de Alba, E. and Nieto de Pascual, J. (2003). A forecasting method for events with stable seasonality, *Revista Agrociencia*, **37,** 33– 44.

[9] Guerrero, V.M., and Elizondo, J.A. (1997). Forecasting a cumulative variable using its partially accumulated data, *Management Science*, **43**, 879–889.

[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]

[10] Lenk, P.J. (1992). Hierarchical Bayesforecasts of multinomial Dirichlet data applied to coupon redemptions, *Journal of Forecasting*, 603– 619.

[11] Oliver, R.M. (1987). Bayesian forecasting with stable seasonal patterns, *Journal of Business and Economic Statistics*, **5**, 77– 86.

سودابه فیض‌بخش کوفلی
دانشجوی کارشناسی ارشد آمار اجتماعی و اقتصادی
تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده‌ی اقتصاد، گروه آمار.
رایانشانی: s.feizbakhsh@yahoo.com

سحر رادمهر
دانشجوی کارشناسی ارشد آمار اجتماعی و اقتصادی
تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده‌ی اقتصاد، گروه آمار.
رایانشانی: s.radmehr11@yahoo.com

محمدرضا صالحی راد
دکتری آمار
تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده‌ی اقتصاد، گروه آمار.
رایانشانی: salehirad@atu.ac.ir

[Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2026-11-23]